


VIDREL^{MD}
(choriogonadotropine alfa injectable)

Directives pour l'administration et l'entreposage

Une seringue pré-remplie d'VIDREL 250 µg

Piston



Tampons à l'alcool
(non inclus)



Aux fins d'illustration seulement.
Ceci ne représente pas le stylo
VIDREL pour le Canada.

ADMINISTRATION


PASSEZ CES ÉTAPES EN REVUE AVANT D'ADMINISTRER VIDREL

Avant de commencer

- Placez le matériel dont vous aurez besoin sur une surface propre.
- Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.
- L'aiguille d'VIDREL ne doit pas entrer en contact avec quoi que ce soit d'autre que la peau nettoyée à l'alcool; conservez le capuchon sur l'aiguille jusqu'à l'utilisation.



**EMD
SERONO**




Étape 1

Choisissez un site d'injection (p. ex., haut de la cuisse, abdomen) à l'aide de l'illustration fournie.



Étape 2

Avec un tampon à l'alcool propre, nettoyez un espace d'environ 5 cm sur 5 cm. Posez le côté usagé du tampon d'alcool près de votre surface de travail ou sur la pochette du tampon d'alcool.



Étape 3


Prenez la seringue et enlevez le capuchon de l'aiguille.



Étape 4

Inversez l'aiguille et tenez la seringue comme s'il s'agissait d'une fléchette à lancer.

De l'autre main, pincez délicatement la peau au site d'injection de manière à ce qu'elle forme un repli.



Étape 5

D'un mouvement vif (comme si vous lanciez une fléchette), introduisez l'aiguille dans la peau à un angle de 90 degrés.

IMPORTANT : Pour l'injection, il faut très peu de force, mais un geste vif.



Étape 6

Une fois que l'aiguille est bien entrée dans la peau, injectez la solution en poussant doucement sur le piston avec votre index.

Prenez tout le temps qu'il faut pour injecter toute la solution.

Étape 7

Retirez immédiatement l'aiguille après l'injection et nettoyez le site d'injection avec le côté propre du tampon d'alcool en faisant des mouvements circulaires. En cas de suintement mineur, appliquez une légère pression pendant une minute.

Lorsque vous avez terminé votre injection, jetez immédiatement toutes les aiguilles et la seringue (sans remettre le capuchon protecteur de l'aiguille) dans le contenant prévu à cet effet. Apportez le contenant dans une clinique ou une pharmacie pour l'élimination appropriée du matériel usagé.



Foire aux questions

Qu'est-ce qu'OVIDREL ?

OVIDREL (choriogonadotrope alfa) est utilisé pour déclencher l'ovulation chez les femmes infertiles présentant un dysfonctionnement ovarien.

Comment OVIDREL est-il administré ?

OVIDREL est offert sous forme d'une solution prête à utiliser fournie dans une seringue pré-remplie.

Puis-je prendre OVIDREL avec d'autres médicaments ?

Veuillez indiquer à votre médecin et à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

Qui peut utiliser OVIDREL ?

OVIDREL est indiqué chez les femmes qui suivent la phase de stimulation d'un traitement de l'infertilité.

Quels sont les effets indésirables associés à l'emploi d'OVIDREL ?

À l'instar des autres préparations d'hCG, OVIDREL peut causer des effets indésirables. De l'inconfort au site d'injection, des douleurs à l'estomac, des nausées et des vomissements ont été signalés. Demandez à l'équipe responsable de votre traitement de discuter des effets secondaires

éventuels avec vous. Comme pour tous les médicaments, il est important de signaler tout changement physique et tout symptôme à votre professionnel de la santé.

Vous devez discuter du risque possible de naissances multiples avec votre médecin avant d'entreprendre un traitement. Enfin, il y a un risque de manifester un syndrome d'hyperstimulation ovarienne (SHO) pendant le traitement avec OVIDREL. Le SHO ne survient que rarement (incidence inférieure à 3 %); toutefois, étant donné que le SHO peut progresser rapidement vers un effet indésirable grave, le traitement par OVIDREL doit être arrêté dès l'apparition des premiers signes de SHO. Consultez votre médecin si vous éprouvez une douleur intense ou un ballonnement de l'estomac ou dans la région pelvienne, des maux d'estomac graves, des vomissements ou un gain de poids.

Qu'est-ce que la hCG ?

La gonadotrophine chorionique humaine, ou la hCG, est une hormone qui participe au cycle de reproduction chez la femme. On la retrouve dans l'urine de femmes enceintes et elle est sécrétée par le placenta.

Qui ne devrait pas prendre OVIDREL ?

OVIDREL est contre-indiqué dans les cas suivants :

1. Hypersensibilité à la choriogonadotropine alfa ou à l'un de ses excipients.
2. Insuffisance ovarienne primaire.
3. Troubles thyroïdiens ou surréniaux non maîtrisés.
4. Tumeurs de l'hypothalamus ou de l'hypophyse.
5. Saignements utérins anormaux d'origine indéterminée.
6. Hypertrophie ovarienne ou kyste d'une étiologie inconnue.
7. Cancer de l'ovaire, de l'utérus ou du sein.
8. Grossesse.

Autres points importants à retenir

1. Ne pas utiliser OVIDREL après la date de péremption.
2. Ne pas congeler OVIDREL.
3. Conserver OVIDREL à l'abri de la lumière.
4. Les seringues pré-remplies contenant la solution OVIDREL doivent être conservées à une température de 2 à 8 °C (dans un réfrigérateur). La patiente peut conserver la seringue pré-remplie à une température de 25 °C (température ambiante) pendant 30 jours, mais doit toutefois la mettre au rebut après cette période.

Vous n'êtes pas seul.
Où trouver de l'aide et de l'information ?

momentum

Le programme de soutien aux patients *MOMENTUM* est un service gratuit et confidentiel qui offre un soutien personnalisé, y compris de l'aide à l'injection, aux personnes qui utilisent les produits de fertilité d'EMD Serono.



fertility.mymomentum.ca

Notre site Web complet destiné aux patients offre les éléments suivants :

- Un soutien technique, y compris des vidéos et des guides pratiques sur l'injection (à télécharger)
- Une foire aux questions sur les produits EMD Serono



1-800-387-8479

- Notre service d'assistance téléphonique *MOMENTUM* gratuit, ouvert en permanence
- Les heures d'ouverture normales sont de 8 h à 20 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi.
- Un service de téléavertisseur est offert après les heures ouvrables pour les demandes urgentes qui ne peuvent pas attendre au prochain jour ouvrable. Pour les appels après les heures régulières, il suffit de laisser votre nom, la raison de votre appel et le numéro de téléphone pour vous rejoindre et une infirmière autorisée appellera rapidement.

**MOMENTUM est offert en plus de
250 langues grâce à des traducteurs agréés.**

MOMENTUM ne fournira aucun commentaire sur un diagnostic individuel, un traitement ni des résultats de laboratoire. Vous devriez discuter de ces questions avec votre fournisseur de soins de santé. *MOMENTUM* est une source de soutien éducatif parrainée par EMD Serono, Canada, et ne remplace en aucun cas les discussions avec votre fournisseur de soins de santé.

Ovidrel^{MD} Monographie de Produit. Date d'autorisation : 16 octobre 2019

Ovidrel^{MD} est une marque de commerce déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

Importateur et distributeur : EMD Serono, une division d'EMD Inc., Canada

Une filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

2695 North Sheridan Way, Bureau 200, Mississauga, Ontario, Canada, L5N 2K6

CA/OVI/1018/0003(1)



MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

**EMD
SERONO**

RH0219F