Étape 14

Prendre la seringue et enlever le capuchon de l'aiguille en le tirant tout droit.

Étape 15

Retourner la seringue; la tenir comme pour "lancer une fléchette".

Avec l'autre main, pincer doucement la peau pour former un léger pli au point d'injection.

Étape 16

Insérer l'aiguille à un angle de 90 degrés avec un mouvement de "lancer de fléchette".

IMPORTANT: L'injection nécessite très peu de force, mais une action rapide.

Étape 17

Une fois que l'aiguille est enfoncée dans la peau, injectez la solution en poussant doucement le piston avec la main qui tient la seringue.

Prenez le temps qu'il faut pour injecter toute la solution.

Étape 18

Retirer immédiatement l'aiguille et nettoyer d'un mouvement circulaire le point d'injection avec le côté non utilisé du tampon imbibé d'alcool.

En cas de léger écoulement, il pourrait être nécessaire d'appliquer une petite pression pendant une minute.

Jeter la seringue et les aiguilles immédiatement après usage dans un contenant pour objets pointus ou tranchants.

Vous n'êtes pas seul.

Où pouvez-vous obtenir de l'aide et davantage de renseignements?

momentum

Le programme de services aux patients *MOMENTUM* est un service gratuit et confidentiel qui offre un soutien personnalisé, y compris de l'aide à l'injection, aux personnes qui utilisent les produits de fertilité d'EMD Serono.

fertility.mymomentum.ca

Sur notre site Web exhaustif qui leur est destiné, les patients trouveront :

- des vidéos d'instructions faciles d'accès
- des guides d'injection à télécharger
- des renseignements additionnels sur nos médicaments
- des réponses aux questions fréquemment posées au sujet des produits d'EMD Serono

1-800-387-8479

- Notre ligne d'assistance téléphonique sans frais *MOMENTUM* est offerte en tout temps.
- Les heures régulières sont de 8 h à 20 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi.
- Pour les demandes urgentes qui ne peuvent pas attendre au jour ouvrable suivant, un service par téléavertisseur est offert. Il suffit de laisser le nom, la raison de l'appel et le numéro de téléphone et une infirmière autorisée rappellera rapidement.

Le service *MOMENTUM* est offert dans plus de 250 langues par l'entremise d'interprètes agréés.

MOMENTUM ne fournira aucun commentaire sur un diagnostic individuel, un traitement, des produits autres que ceux d'EMD Serono ou des résultats de laboratoire. Vous devriez discuter de ces questions avec votre fournisseur de soins de santé. MOMENTUM est une source de soutien éducatif parrainée par EMD Serono, Canada, et ne remplace en aucun cas les discussions avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour de plus amples renseignements à propos de CETROTIDE, veuillez consulter le feuillet des renseignements pour le consommateur inséré dans l'emballage du produit ou la monographie de produit la plus récente.

Cetrotide[MD]
Cétrorélix pour injection

Référence: Monographie de produit Cetrotide[MD] EMD Serono, 13 juin 2019.

Copyright © 2020 EMD Serono. Tous droits réservés.
EMD Serono, une division d'EMD Inc., Canada
Une compagnie de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne,
2695 North Sheridan Way, Suite 200, Mississauga, Ontario L5K 2N6 Canada

Cetrotide est une marque de commerce de Zentaris IVF GmbH, employée sous licence par Merck KGaA, Darmstadt ou ses sociétés affiliées.

MEMBER OF INNOVATIVE MEDICINES CANADA

CA-CET-00008 RH0227F

EMD SERONO

Cetrotide[MD]
Cétrorélix pour injection

Guide d'administration



CETROTIDE est offert en 0,25 mg

Avant de commencer:

1. Nettoyez votre plan de travail avec du savon et de l'eau.
2. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau et essuyez-les avec une serviette propre.
3. Étalez tout ce dont vous avez besoin sur une surface propre : un flacon de CETROTIDE, une seringue pré-remplie, une aiguille de mélange (marque jaune), une aiguille pour l'injection (marque grise) et deux tampons imbibés d'alcool.

EMD SERONO

Étape 1

Retirer le capuchon de plastique du flacon de CETROTIDE.

Étape 2

Nettoyer le bouchon en caoutchouc puis l'anneau en aluminium avec un tampon imbibé d'alcool.

Jetez le tampon imbibé d'alcool.



Étape 3

Prendre la seringue pré-remplie de diluant et dévisser le capuchon. Prendre garde à ne pas retirer l'embout de raccordement.

Remarque : la seringue est munie d'une butée arrière – ne pas la retirer.



Étape 4

Prendre l'aiguille de mélange jaune et dévisser l'extrémité jaune.

Visser l'aiguille sur l'embout de raccordement de la seringue pré-remplie afin qu'elle y soit fixée de façon sécuritaire.

En tenant le cylindre de verre, enlever avec soin le capuchon de l'aiguille en le tirant tout droit.



Étape 5

Insérer l'aiguille dans le centre du bouchon en caoutchouc du flacon de CETROTIDE.

Injecter l'eau de la seringue pré-remplie dans le flacon en poussant lentement le piston de la seringue. Ne dissoudre la poudre CETROTIDE qu'avec l'eau contenue dans la seringue pré-remplie.



Étape 6

Sans retirer l'aiguille du flacon, doucement tourner le flacon jusqu'à ce que la solution soit limpide et sans particules.

Éviter la formation de bulles; cela peut se produire à cause d'une agitation trop vigoureuse du flacon.

IMPORTANT: Ne pas utiliser la solution si elle semble brouillée, grumeleuse ou décolorée.



Étape 7

a. Tirer sur le piston afin d'aspirer tout le contenu du flacon dans la seringue. S'il reste du liquide dans le flacon , retourner le flacon, retirer l'aiguille jusqu'à ce que son extrémité se trouve juste à l'intérieur du bouchon. En regardant par le trou du bouchon depuis le côté, il est possible de contrôler le mouvement de l'aiguille et du liquide.



b. Il est important de prélever tout le contenu du flacon.

IMPORTANT: Prendre garde à ne pas retirer la butée arrière ni sortir le piston de la seringue.



Étape 8

Retirer l'aiguille du flacon.

Remettre avec précaution le capuchon sur l'aiguille.

Étape 9

Dévisser le capuchon pour détacher l'aiguille de la seringue.

Jeter l'aiguille de mélange dans un contenant pour objets pointus et tranchants. Déposer avec soin la seringue sur une surface propre.

Étape 10

Dévisser le sceau gris pour retirer l'extrémité de l'aiguille d'injection grise afin de la sortir de son emballage.

Visser l'aiguille sur l'embout de raccordement de la seringue afin qu'elle y soit fixée de façon sécuritaire.

En tenant le cylindre de verre, enlever avec soin le capuchon de l'aiguille en le tirant tout droit.

Étape 11

a. Tenir la seringue avec l'aiguille pointée vers le haut et la tapoter doucement s'il y a des bulles d'air.

b. S'il n'y a pas de bulles d'air ou s'il n'y a pas d'air dans la partie supérieure de la seringue, tirer légèrement sur le piston afin d'en aspirer un peu.

Replacer le capuchon de l'aiguille avec soin et déposer la seringue sur une surface propre.

IMPORTANT: Il est important qu'il y ait un peu d'air dans la seringue avant l'injection. Cela permettra de s'assurer d'avoir injecté l'intégralité du médicament. L'air restera dans l'aiguille. Administrer la solution immédiatement après l'avoir préparée.





Étape 12

Choisir un point d'injection dans la partie inférieure de l'abdomen. Ce point doit de préférence être près du nombril, mais au moins à un pouce (deux centimètres et demi) de distance de celui-ci.

Choisir un point d'injection différent chaque jour afin de minimiser l'irritation locale.



Étape 13

Nettoyer la peau au point d'injection avec un tampon imbibé d'alcool et attendre que l'alcool sèche.

Garder le tampon imbibé d'alcool à portée de main.