

Qui ne devrait pas prendre OVIDREL^{MD} ?

OVIDREL est contre-indiqué dans les cas suivants: Hypersensibilité à la choriogonadotropine alpha ou à l'un de ses excipients, insuffisance ovarienne primaire, troubles thyroïdiens ou surrénaux non maîtrisés, tumeurs de l'hypothalamus ou de l'hypophyse, saignements utérins anormaux d'origine indéterminée, hypertrophie ovarienne ou kyste d'une étiologie inconnue, cancer de l'ovaire, de l'utérus ou du sein, ou grossesse.

Autres points importants à retenir

- Ne pas utiliser OVIDREL après la date de péremption.
- Ne pas congeler OVIDREL.
- Protéger OVIDREL de la lumière.
- Conserver OVIDREL à une température de 25 °C (température ambiante) pendant 30 jours au maximum ou au réfrigérateur jusqu'à la date de péremption.
- Garder le médicament hors de la portée des enfants.

Où puis-je obtenir de l'aide et trouver de plus amples renseignements ?



Ce service téléphonique confidentiel et gratuit offre :

- renseignements généraux sur la fertilité;
- informations sur la fertilité aux personnes qui utilisent les produits de fertilité de EMD Serono, Canada.

Appelez la Ligne conseil en fertilité sans frais au 1-800-387-8479 du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (HNE). Un service téléphonique est offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour les demandes urgentes qui ne peuvent pas attendre au prochain jour ouvrable. Laissez votre nom, la raison de l'appel et votre numéro de téléphone, et une infirmière autorisée vous rappellera promptement. Le service est offert en 250 langues grâce à des interprètes agréés.

Remarque : L'équipe de la Ligne conseil en fertilité ne fera aucun commentaire sur un diagnostic individuel, un traitement, ni des résultats de laboratoire. Vous devez discuter de ces questions avec votre professionnel de soins de santé.

La Ligne conseil en fertilité offre un service de soutien informatif commandité par EMD Serono, Canada et n'a pas pour objectif de remplacer les échanges avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour de plus amples renseignements à propos de Ovidrel^{MD}, veuillez consulter la notice d'accompagnement fournie avec le produit ou de la monographie de produit.

EMD Serono



1-800-387-8479

La Ligne conseil en fertilité est un service téléphonique confidentiel et gratuit offre soutien aux personnes qui utilisent les produits de fertilité de EMD Serono, Canada.

Membre



Ovidrel^{MD} est une Marque déposée d'Ares Trading SA, utilisée avec sa permission.

11-RH-0025-01 F

P OVIDREL^{MD}
(choriogonadotropine alpha injectable)

DIRECTIVES POUR L'ADMINISTRATION ET L'ENTREPOSAGE



Une seringue pré-remplie d'OVIDREL 250 µg

Piston


Tampons à l'alcool

Administration PASSEZ CES ÉTAPES EN REVUE AVANT D'ADMINISTRER OVIDREL

Avant de commencer

- Placez le matériel dont vous aurez besoin sur une surface propre.
- Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.
- L'aiguille d'OVIDREL ne doit pas entrer en contact avec quoi que ce soit d'autre que la peau nettoyée à l'alcool; conservez le capuchon sur l'aiguille jusqu'à l'utilisation.





Étape 1

Choisissez un site d'injection (p. ex., haut de la cuisse, abdomen) à l'aide de l'illustration fournie.



Étape 2

Avec un tampon à l'alcool propre, nettoyez un espace d'environ 5 cm sur 5 cm. Posez le côté usagé du tampon d'alcool près de votre surface de travail ou sur la pochette du tampon d'alcool.



Étape 3


Prenez la seringue et enlevez le capuchon de l'aiguille.



Étape 4

Inversez l'aiguille et tenez la seringue comme s'il s'agissait d'une fléchette à lancer.

De l'autre main, pincez délicatement la peau au site d'injection de manière à ce qu'elle forme un repli.



Étape 5

D'un mouvement vif (comme si vous lanciez une fléchette), introduisez l'aiguille dans la peau à un angle de 90 degrés.

IMPORTANT : Pour l'injection, il faut très peu de force, mais un geste vif.



Étape 6

Une fois que l'aiguille est bien entrée dans la peau, injectez la solution en poussant doucement sur le piston avec votre index.

Prenez tout le temps qu'il faut pour injecter toute la solution.

Étape 7

Retirez immédiatement l'aiguille après l'injection et nettoyez le site d'injection avec le côté propre du tampon d'alcool en faisant des mouvements circulaires. En cas de suintement mineur, appliquez une légère pression pendant une minute.

Lorsque vous avez terminé votre injection, jetez immédiatement toutes les aiguilles et la seringue (sans remettre le capuchon protecteur de l'aiguille) dans le contenant prévu à cet effet. Apportez le contenant dans une clinique ou une pharmacie pour l'élimination appropriée du matériel usagé.



Foires aux questions

Qu'est-ce qu'OVIDREL^{MD} ?

OVIDREL^{MD} (choriogonadotropine alpha) est utilisé pour déclencher l'ovulation chez les femmes infertiles présentant un dysfonctionnement ovarien.

Comment OVIDREL^{MD} est-il administré ?

OVIDREL est offert sous forme d'une solution prête à utiliser fournie dans une seringue pré-remplie.

Puis-je prendre OVIDREL^{MD} avec d'autres médicaments ?

Veillez indiquer à votre médecin et à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

Qui peut utiliser OVIDREL^{MD} ?

OVIDREL^{MD} est indiqué chez les femmes qui suivent la phase de stimulation d'un traitement de l'infertilité.

Quels sont les effets indésirables associés à l'emploi d'OVIDREL^{MD} ?

À l'instar des autres préparations d'hCG, OVIDREL peut causer des effets indésirables. De l'inconfort au site d'injection, des douleurs à l'estomac, des nausées et des vomissements ont été signalés. Demandez à l'équipe responsable de votre traitement de discuter des effets secondaires éventuels avec vous.

Comme pour tous les médicaments, il est important de signaler tout changement physique et tout symptôme à votre professionnel de la santé.

Vous devez discuter du risque possible de naissances multiples avec votre médecin avant d'entreprendre un traitement. Enfin, il y a un risque de manifester un syndrome d'hyperstimulation ovarienne (SHO) pendant le traitement avec OVIDREL. Le SHO ne survient que rarement (incidence inférieure à 3 %); toutefois, étant donné que le SHO peut progresser rapidement vers un effet indésirable grave, le traitement par OVIDREL doit être arrêté dès l'apparition des premiers signes de SHO. Consultez votre médecin si vous éprouvez une douleur intense ou un ballonnement de l'estomac ou dans la région pelvienne, des maux d'estomac graves, des vomissements ou un gain de poids.

Qu'est-ce que la hCG ?

La gonadotrophine chorionique humaine, ou la hCG, est une hormone qui participe au cycle de reproduction chez la femme. On la retrouve dans l'urine de femmes enceintes et elle est sécrétée par le placenta.