

Foires aux questions

À quoi sert CETROTIDE ?

CETROTIDE est utilisé dans le cadre du traitement hormonal pour la stimulation ovarienne. CETROTIDE bloque l'effet d'une hormone naturelle, appelée gonadolibérine (GnRH). La GnRH contrôle la sécrétion d'une autre hormone appelée hormone lutéinisante (LH). La LH est l'hormone qui déclenche l'ovulation (libération de l'ovule) pendant le cycle menstruel. CETROTIDE permet la libération d'un ovule sous surveillance afin qu'elle se produise à un moment optimal pour que survienne une grossesse.

Quels formats sont offerts ?

CETROTIDE est offert en deux formats – 0,25 mg et 3 mg. Les deux formats contiennent de l'acétate de cétrorélix et du mannitol en tant qu'ingrédient non actif.

Que dois-je faire si j'administre plus que la dose prescrite de CETROTIDE ?

Si vous croyez avoir pris plus de CETROTIDE que la dose prescrite, contactez votre médecin sur-le-champ.

Que dois-je faire si j'oublie de prendre une dose ?

Si vous avez oublié de prendre une dose de CETROTIDE, ne pas doubler la dose. Discuter avec votre médecin du moment auquel vous devez recevoir votre prochaine dose. Veuillez vérifier avec votre médecin si vous avez des questions à ce sujet.

Combien de temps puis-je conserver CETROTIDE après la préparation de la solution ?

La solution doit être utilisée immédiatement après sa préparation. Le flacon et la seringue ne doivent servir qu'une seule fois.

Quels sont les effets secondaires possibles ?

Comme avec tous les médicaments, certains effets secondaires peuvent survenir. Les effets secondaires fréquents incluent : maux de tête, des réactions locales au site d'injection (p. ex. : douleurs, rougeurs, prurit tuméfié, érythème, hématome et/ou irritation au site d'injection) nausées.

Dans de rares cas, des réactions allergiques peuvent survenir : échauffement, rougeurs, prurit (souvent dans l'aîne ou aux aisselles), zones rouges, démangeaisons, éruptions cutanées (urticaire), écoulement nasal, pouls rapide ou irrégulier, gonflement de la langue et de la gorge, étournements, respiration sifflante, forte gêne respiratoire ou encore vertiges).

Il se peut que vous souffriez d'une réaction allergique potentiellement mortelle à ce médicament. Si vous notez un ou plusieurs effet(s) secondaire(s) cité(s) précédemment, cessez immédiatement le traitement CETROTIDE et consultez immédiatement un médecin.

Au cours ou à la suite de la stimulation hormonale des ovaires, il peut se produire un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne est une maladie rare qui se produit lorsque trop de follicules (partie de l'ovaire qui devient un ovule) se développent et causent un malaise abdominal ou de la douleur, des nausées, de la diarrhée et parfois de la difficulté à respirer. Dans les cas extrêmes, il faut avoir recours à l'hospitalisation. Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne est potentiellement très grave, mais peut être évité par une surveillance étroite par votre médecin.

Communiquez avec votre médecin si vous avez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans ce feuillet de renseignements, ou si vous n'êtes pas certaine de l'effet de ce médicament.

Comment entreposer CETROTIDE ?

- Entrez CETROTIDE dans un endroit frais et sec (entre 2 °C et 25 °C).
- Protégez CETROTIDE de l'humidité et de la chaleur excessives. Ne le congélez pas.
- Gardez le plateau emballé dans sa boîte pour qu'il soit à l'abri de la lumière.
- Vérifiez toujours la date de péremption sur les étiquettes du produit avant l'utilisation – n'utilisez pas CETROTIDE après la date de péremption.
- Après la date de péremption, jetez le flacon et la seringue dans un contenant prévu à cette fin.
- Gardez le médicament hors de la portée des enfants.
- Ce médicament a été prescrit pour votre maladie particulière. Ne l'utilisez pas pour une autre maladie et ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Pour de plus amples renseignements à propos de CETROTIDE, veuillez consulter la notice d'accompagnement fournie avec le produit, ou de la monographie de produit.

Comment s'administre CETROTIDE ?

CETROTIDE doit être injecté sous la peau, en une seule dose de 3 mg ou en doses multiples quotidiennes de 0,25 mg, selon les directives de votre médecin.

Pour le schéma posologique unidose, 3 mg de CETROTIDE est administré lorsque la concentration sérique d'oestradiol indique une réponse appropriée à la stimulation, habituellement le 7^e jour de la stimulation (variation du jour 5 à 9). Si la hCG n'a pas été administrée en moins de quatre jours après l'injection de 3 mg de CETROTIDE, 0,25 mg de CETROTIDE devrait être administré une fois par jour jusqu'au jour de l'administration de hCG.

Pour le schéma posologique quotidienne, 0,25 mg de CETROTIDE est administré au 5^e jour (matin ou soir) de la stimulation ou au 6^e jour (matin) et cette dose continue d'être administrée quotidiennement jusqu'au jour de l'administration de hCG.

Qui ne doit pas utiliser CETROTIDE ?

Avant d'utiliser CETROTIDE, assurez-vous que votre médecin est au courant des renseignements personnels suivants : vous prenez actuellement, ou avez pris récemment, d'autres médicaments y compris des médicaments en vente libre; vous êtes allergique à l'acétate de cétrorélix ou au mannitol; vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou vous allaitez; vous êtes allergique à la GnRH ou à tout autre analogue de la GnRH (p. ex., acétate de leuprolide, acétate de goséréline); vous avez une maladie modérée ou grave du foie ou des reins.

Où puis-je obtenir de l'aide et davantage de renseignements ?



Le programme de services aux patients MOMENTUM (anciennement, Ligne-conseil en Fertilité) est un service gratuit et confidentiel qui offre un soutien personnalisé, y compris de l'aide à l'injection, aux personnes qui utilisent les produits de fertilité d'EMD Serono.

Appelez MOMENTUM sans frais au 1 800 387-8479 entre 8 h et 20 h (heure normale de l'Est), du lundi au vendredi. En outre, MOMENTUM est accessible jour et nuit pour les demandes urgentes qui ne peuvent pas attendre au jour ouvrable suivant. Pour les appels après les heures régulières, il suffit de laisser le nom, la raison de l'appel et le numéro de téléphone et une infirmière autorisée rappellera rapidement.

Le service MOMENTUM est offert dans plus de 250 langues par l'entremise d'interprètes agréés.

MOMENTUM est aussi offert en ligne à fertility.mymomentum.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de CETROTIDE, veuillez consulter la notice d'accompagnement du produit fournie avec le médicament.

MOMENTUM ne fournira aucun commentaire sur un diagnostic individuel, un traitement ni des résultats de laboratoire. Vous devriez discuter de ces questions avec votre fournisseur de soins de santé.

MOMENTUM est une source de soutien éducatif parrainée par EMD Serono, Canada, et ne remplace en aucun cas les discussions avec votre fournisseur de soins de santé.



1 800 387-8479

MOMENTUM est un service téléphonique confidentiel et gratuit offre soutien aux personnes qui utilisent les produits de fertilité de EMD Serono, Canada.




Cetrotide^{MD} sont des marques déposées d'Ares Trading SA, utilisée avec sa permission.

11-RH-0024-01F



DIRECTIVES POUR L'ADMINISTRATION ET L'ENTREPOSAGE



Cetrotide^{MD} est offert en :

- 0,25 mg
- 3 mg





Avant de commencer:

1. Nettoyez votre plan de travail avec du savon et de l'eau.
2. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau et essuyez-les avec une serviette propre.
3. Étapez tout ce dont vous avez besoin sur une surface propre (un flacon de médicament, une seringue pré-remplie contenant le diluant, une aiguille de mélange (marque jaune), une aiguille pour l'injection (marque grise) et deux tampons imbibés d'alcool).



Étape 1

Enlevez le capuchon protecteur du flacon de médicament.



Étape 2

Essuyez l'anneau en aluminium et le bouchon en caoutchouc avec un tampon à l'alcool.

Jetez le tampon à l'alcool.



Étape 3

Prenez la seringue pré-remplie de diluant et enlevez le capuchon.



Étape 4

Prenez l'aiguille de mélange (marque jaune) et enlevez l'emballage.

Vissez fermement l'aiguille sur la seringue pré-remplie.

Retirez délicatement le capuchon de l'aiguille.



Étape 5

Insérez l'aiguille dans le centre du bouchon en caoutchouc du flacon de médicament.

Injectez l'eau dans le flacon en poussant lentement le piston de la seringue. Dissolvez la poudre Centrotide^{MD} seulement avec l'eau contenue dans la seringue pré-remplie.




Étape 6

Sans retirer l'aiguille du flacon, agitez ou tournez doucement le flacon jusqu'à ce que la solution soit limpide et sans particule.


Évitez la formation de bulles.

IMPORTANT : N'utilisez pas la solution si elle est trouble, si elle contient des particules en suspension ou si elle a une couleur anormale.




Étape 7

Prélevez tout le contenu du flacon dans la seringue. S'il y a du liquide qui reste dans la seringue, inversez le flacon, retirez l'aiguille jusqu'à ce que l'ouverture de l'aiguille soit juste à l'intérieur du bouchon. Si vous regardez sur le côté par le trou dans le bouchon, vous pouvez contrôler le mouvement de l'aiguille et du liquide. Il est important de prélever tout le contenu du flacon.



Étape 8

Retirez l'aiguille du flacon. Remettez délicatement le capuchon sur l'aiguille. Déposez avec soin la seringue sur une surface propre.



Étape 9

Tournez l'aiguille pour la détacher de la seringue.


Jetez l'aiguille de mélange dans un contenant réservé à cette fin. Déposez avec soin la seringue sur une surface propre.



Étape 10

Prenez l'aiguille (marque grise) pour injection et retirez l'emballage. Vissez fermement l'aiguille sur la seringue.

Enlevez avec soin le capuchon de l'aiguille en le retirant d'un seul coup.




Étape 11

a. Tenez la seringue avec l'aiguille pointée vers le haut et tapez doucement la seringue pour voir s'il y a des bulles d'air.

b. S'il n'y a pas de bulles d'air, ou s'il n'y a pas d'espace d'air dans la partie supérieure de la seringue, tirez le piston pour qu'il y ait un espace de 0,1 ml.

Remplacez avec soin le capuchon de l'aiguille et déposez la seringue sur une surface propre.

IMPORTANT : Il doit y avoir un espace d'air dans la seringue avant l'injection. C'est ce qui assurera que tout le médicament a été injecté.



Étape 12

Choisissez un site d'injection dans la paroi abdominale basse.


Si vous suivez le schéma posologique 0,25 mg, choisissez un site d'injection différent chaque jour afin de minimiser les risques d'irritation locale.



Étape 13

Prenez un tampon imbibé d'alcool, nettoyez la peau au site d'injection et laissez l'alcool sécher.

Gardez le tampon d'alcool à portée de la main.



Étape 14

Prenez la seringue et enlevez le capuchon de l'aiguille.



Étape 15

Inversez la seringue en la tenant comme s'il s'agissait d'une fléchette à lancer.

De l'autre main, pincez délicatement la peau au site d'injection de manière à ce qu'elle forme un repli.



Étape 16

D'un mouvement vif (comme si vous lanciez une fléchette), introduisez l'aiguille dans la peau à un angle de 90 degrés.

IMPORTANT : Pour l'injection, il faut très peu de force, mais un geste vif.



Étape 17

Une fois que l'aiguille est enfoncée dans la peau, injectez la solution en poussant doucement le piston avec la main qui tient la seringue.

Prenez le temps qu'il faut pour injecter toute la solution.



Étape 18

Retirez immédiatement l'aiguille et, d'un mouvement circulaire, essuyez le site d'injection avec la partie non utilisée du tampon à l'alcool.

S'il y a un léger écoulement, vous devrez peut-être appliquer un peu de pression pendant une minute.

Une fois l'injection terminée, jetez immédiatement l'aiguille et la seringue dans un contenant prévu à cet effet.