

Crinone^{MD}

gel de progestérone 8%

Directives pour l'administration et l'entreposage

CRINONE^{MD}

Gel de progestérone

Embout mince
(partie fine)

Embout épais
(partie renflée)

Embout détachable
(section plate)

ADMINISTRATION

PASSEZ CES ÉTAPES EN REVUE AVANT D'ADMINISTRER CRINONE


Avant de commencer :

- Sortez l'applicateur de son emballage scellé.
- NE retirez PAS l'embout détachable à ce moment.




EMD
SERONO

Étape 1



Tenez l'applicateur par la partie renflée. Secouez-le comme un thermomètre afin que le contenu descende dans la partie fine.

Étape 2



Retirez l'embout détachable en le tournant, puis jetez-le.

Étape 3



L'applicateur peut être inséré dans le vagin alors que vous êtes assise ou en position allongée avec les genoux pliés. Insérez doucement la partie fine à l'intérieur du vagin.

Étape 4



Pressez la partie renflée de l'applicateur avec fermeté pour expulser le gel de l'applicateur. Retirez l'applicateur et jetez-le.

Foires aux questions

Qu'est-ce que CRINONE ?

Le principe actif de ce médicament est la progestérone. Chaque dose de gel contient 90 mg (gel à 8 %) de progestérone.

CRINONE est utilisé pour le soutien de la phase lutéale dans les cycles induits comme pour la fécondation in vitro (FIV) y compris chez les femmes, avec ou sans ovaires fonctionnels, appelées à recevoir un ovocyte.

Comment utiliser CRINONE ?

Une application de CRINONE 8 % (90 mg de progestérone) tous les jours, dès le premier jour du transfert. Dans certains cas, la dose peut être augmentée à deux applications de CRINONE 8 % par jour. S'il y a grossesse, le traitement doit être maintenu pendant 10 à 12 semaines.

CRINONE doit être appliqué directement dans le vagin à l'aide de l'applicateur spécialement conçu à cette fin. CRINONE recouvre la muqueuse du vagin afin d'y libérer de la progestérone de façon soutenue.

Est-il normal qu'il reste du gel dans l'applicateur après l'utilisation ?

Chaque applicateur contient une quantité légèrement plus élevée de gel que la quantité prescrite puisqu'une infime partie du produit a tendance à adhérer aux parois de l'applicateur. Il est donc normal qu'une petite quantité de gel demeure dans l'applicateur. Toute quantité restante de gel dans l'applicateur doit être jetée.

Si j'ai des pertes après l'application, cela signifie-t-il que le CRINONE s'écoule ?

En général, le gel se fixe aux parois du vagin où le médicament est absorbé. Ne vous inquiétez pas si vous avez des pertes contenant des petits granules plusieurs jours après le début du traitement. Il est normal qu'il y ait une légère accumulation de résidus et elle ne pose aucun risque. L'accumulation de gel peut être moindre si le gel est appliqué le matin puisque certains mouvements comme la

marche peuvent inciter le gel à s'étendre sur les parois vaginales.

Il n'est donc pas nécessaire de rester étendue après l'application de CRINONE. Si l'accumulation de gel vous incommode, parlez-en à votre médecin.

Comment dois-je entreposer CRINONE ?

CRINONE doit être conservé à la température ambiante (15-25 °C) et ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, chaudes ou froides. Comme pour tout médicament, les applicateurs de gel doivent être conservés hors de la portée des enfants.

Quelles sont les contre-indications de CRINONE ?

CRINONE ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- saignements vaginaux n'ayant pas fait l'objet d'un diagnostic
- dysfonctionnement hépatique ou maladie du foie
- cancer du sein ou des organes génitaux, connu ou suspecté
- néoplasie progestérone dépendante, connue ou suspectée
- sensibilité connue à CRINONE (progestérone ou l'un des excipients)
- rétention fœtale
- thrombophlébite, troubles thromboemboliques, apoplexie cérébrale ou antécédents de ces conditions
- porphyrie aiguë

Quels sont les effets secondaires de CRINONE ?

Les effets indésirables suivants ont été signalés avec l'utilisation de CRINONE : crampes, douleurs mammaires, maux de tête, douleurs, ballonnements, nausées, pertes vaginales, somnolence, saignements en dehors des règles (métrorragie), irritation vaginale et réactions au site d'application. Il y a eu occasionnellement des cas de somnolence avec CRINONE. Ainsi, la PRUDENCE est de mise pour la conduite de véhicules ou la manipulation de machinerie. Si vous ressentez ces effets et qu'ils deviennent gênants, veuillez consulter votre médecin.

Que dois-je faire si j'oublie d'administrer une dose de CRINONE ?

Dose oubliée : Si vous oubliez une application de CRINONE un jour de traitement régulier, procédez à l'application le jour suivant, puis reprenez votre horaire normal. Il ne faut pas administrer de doubles doses pour compenser l'oubli d'une dose.

Surdosage : On ne prévoit pas de surdosage puisque chaque dose est administrée à l'aide d'un applicateur à usage unique jetable. Cependant, le cas échéant, le traitement avec CRINONE 8 % doit être interrompu.

Autres points importants à retenir

- Ce médicament vous a été prescrit en raison de votre état de santé actuel. Ne l'utilisez pas pour d'autres conditions médicales.
- Ne pas utiliser CRINONE après la date d'expiration imprimée sur la boîte.
- Ne permettez pas à d'autres personnes d'utiliser votre médicament et n'utilisez pas les médicaments de quelqu'un d'autre.
- CRINONE ne doit pas être utilisé de concert avec d'autres préparations vaginales locales. Si l'on doit procéder à un autre traitement vaginal en concomitance, il faut attendre au moins six heures avant ou après l'administration de CRINONE. Dites à votre médecin quels médicaments vous prenez. Gardez toujours sur vous une fiche d'information médicale énumérant les médicaments que vous prenez. Cette fiche peut se révéler très utile en cas d'accident. Faites en sorte que les personnes qui vivent avec vous ou prennent soin de vous lisent cette notice.
- CRINONE ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.
- CRINONE ne doit pas être utilisé chez les enfants.
- **Pour de plus amples renseignements à propos de CRINONE, veuillez consulter la notice d'accompagnement fournie avec le produit.**

Vous n'êtes pas seul.

Où trouver de l'aide et de l'information?

momentum

Le programme de soutien aux patients *MOMENTUM* est un service gratuit et confidentiel qui offre un soutien personnalisé, y compris de l'aide à l'injection, aux personnes qui utilisent les produits de fertilité d'EMD Serono.

fertility.mymomentum.ca

Notre site Web complet destiné aux patients offre les éléments suivants :

- Un soutien technique, y compris des vidéos et des guides pratiques sur l'injection (à télécharger)
- Une foire aux questions sur les produits EMD Serono

1-800-387-8479

- Notre service d'assistance téléphonique *MOMENTUM* gratuit est ouvert en permanence.
- Les heures d'ouverture normales sont de 8 h à 20 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi.
- Un service de téléavertisseur est offert après les heures ouvrables pour les demandes urgentes qui ne peuvent pas attendre au prochain jour ouvrable. Pour les appels après les heures régulières, il suffit de laisser votre nom, la raison de votre appel et le numéro de téléphone pour vous rejoindre et une infirmière autorisée vous rappellera rapidement.

***MOMENTUM* est offert en plus de 250 langues grâce à des traducteurs agréés.**

MOMENTUM ne fournira aucun commentaire sur un diagnostic individuel, un traitement, des résultats de laboratoire, ni des produits d'un autre fabricant qu'EMD Serono. Vous devriez discuter de ces questions avec votre fournisseur de soins de santé. *MOMENTUM* est une source de soutien éducatif parrainée par EMD Serono, Canada, et ne remplace en aucun cas les discussions avec votre fournisseur de soins de santé.


gel de progestérone 8%

Monographie de produit Crinone^{MD}. EMD Serono, 2 septembre 2014.

© EMD Serono, 2020. Tous droits réservés. EMD Serono, une division d'EMD Inc., Canada
Une filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
2695 North Sheridan Way, Suite 200, Mississauga, Ontario L5K 2N6 Canada
Crinone^{MD} est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

CA/CRI/0620/0001



MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

**EMD
SERONO**

RH0223F